Изв. Донова
22.05.25

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните
Областна дирекция по безопасност на храните гр. Пазарджик

е.о. Вх.№ 24-148-9
22.05.25

БАБХ - Областна дирекция по безопасност на храните
Изх. № 113-2814
Пазарджик 22.05.25

ДО ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

КОПИЕ ДО:
ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ", ГР. ПАЗАРДЖИК
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ВЕЛИНГРАД, РАКИТОВО, ПЕЩЕРА, СЪРНИЦА, ЛЕСИЧОВО, БЕЛОВО, БАТАК, СЕПТЕМВРИ, БРАЦИГОВО

ОТНОСНО: Установено нападение от Мароканският скакалец (*Dociostaurus maroccanus Thunbg*) в област Благоевград и заповед на министъра на земеделието и храните за обявяване на каламитет на територията на област Благоевград.

УВАЖАЕМА Г-ЖО КАЙТАЗОВА,

През първата половина на месец май **Мароканският скакалец (*Dociostaurus maroccanus Thunbg*)** е установен в област Благоевград, община Сандански. Излюпване е констатирано само в ливади и пасища. Хладното и дъждовно време през първата половина на месец май забави излюпването на вида.

При извършваните обследвания през 2024г. от отдел "Растителна защита" в ОДБХ Пазарджик не е установено разпространение на вида на територията на област Пазарджик.

При проведените наблюдения на територията на област Пазарджик, към момента (22.05.2025 г.), не е установено поява и разпространение на неприятеля. Не са получавани сигнали от земеделски стопани или кметове на населени места на територията на областта за необичайно висока плътност от марокански скакалец. Наблюдава се повишаване плътността на видове горски и полски скакалци по ливади и пасища.

Видът намира благоприятни условия за снасяне на яйцата си и за развитие върху целинни и пустеещи земи, ливади, пасища и др. Напада почти всички културни растения, като предпочита тревистата растителност - житни, едногодишни и многогодишни бобови, зеленчукови, технически култури, ливадни треви и др. При висока плътност се развива т.нар. **стадна фаза**, която живее групово и е значително по-опасна. Стадната фаза образува първични огнища предимно в необработваемите тревисти места, в сухите пасища и поляни, с по-бедна растителност, откъдето преминава по посевите с културни растения.



Мароканският скакалец развива едно поколение годишно и зимува като яйце, в яйчни мехчета, в почвата. Ларвите започват да се излюпват в края на април - началото на май, когато средната денонощна температура на въздуха в

Гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Найчо Цанов" № 4
034/ 44 42 12, 034/ 44 42 12; E-mail – rvs_13@bfsa.bg; www.bfsa.egov.bg
☐ Ниво 3, TPL-RED ☐ Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN ☐ Ниво 0, TPL-WHITE

продължение на няколко дни се задържи 16-17°С. При излизането си те са бели, с удължена почти червеобразна форма. До няколко часа придобиват специфичната си форма и покафеняват.

При ниска плътност (на единица площ) **Мароканският скакалец** води индивидуален начина на живот. При висока плътност е стадно насекомо (стадна фаза). Стадността се проявява още след излюпването на ларвите и продължава през целия им живот. Отначало те се събират в малобройни групи, които по-късно се обединяват помежду си и образуват големи съобщества. Възрастните насекоми се появяват в края на май - първата половина на юни и започват да летят. Хранят се, като нагризват надземните части на растенията

Мароканският скакалец е установяван във висока плътност на територията на област Пазарджик през 2002 година в района с. Фотиново и с. Радилово, където е извеждана химична борба.

Предвид установената висока плътност в област Благоевград е необходимо при констатирано нападение или съмнение за такова кметовете на населените места в областта да уведомяват ОДБХ Пазарджик, отдел „ Растителна защита" за предприемане на действия по компетентност.

С уважение,
Д-Р ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ, ОНС „ДОКТОР"
ДИРЕКТОР НА ОДБХ ПАЗАРДЖИК

ИБ/РЗ/ОДБХ Пк